



RETTERSPITZ INNERLICH GEBRAUCHSINFORMATION

VORBEMERKUNG ZUR GEBRAUCHSINFORMATION

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Retterspitz Innerlich* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

HANDELSNAME, DARREICHUNGSFORM

Retterspitz Innerlich, Flüssigkeit zum Einnehmen.

PACKUNGSGRÖßEN UND INHALT

Retterspitz Innerlich ist in Flaschen mit 350 ml und 1 Liter als einzunehmende Flüssigkeit erhältlich.

INHALTSSTOFFE

Gereinigtes Wasser, Thymianöl, Orangenöl, Zitronenöl, Weinsäure, Citronensäure-Monohydrat, Alaun, Hühnerlei denaturiert, gehärtet, keimfrei, Medizinische Seife, Ethanol.

GEGENANZEIGEN

Retterspitz Innerlich darf nicht bei dialysepflichtigen Patienten angewendet werden.

WAS IST RETTERSPITZ INNERLICH UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET ?

- bei Reizmagen
- bei Magenschmerzen
- bei Sodbrennen
- bei Blähungen
- bei Untersäuerung

- bei Übersäuerung
- bei Völlegefühl

Retterspitz Innerlich ist eine Flüssigkeit mit Pufferwirkung zur Herstellung des physiologischen Magenmilieus.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON RETTERSPITZ INNERLICH BEACHTEN ?

Prüfen Sie, ob eine Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion gegen einen Inhaltsstoff von *Retterspitz Innerlich* vorliegt.

WAS MÜSSEN SIE BEI DER ANWENDUNG VON RETTERSPITZ INNERLICH BEACHTEN ?

Bei längerem Stehen der Flasche bildet sich ein Bodensatz, der vor jedem Gebrauch durch kräftiges Schütteln verteilt werden muss. Der Bodensatz entsteht durch die natürliche und unvermeidliche Flöckchenbildung von Eiweiß, er gehört zum normalen Erscheinungsbild des Mittels. Die Flöckchen bilden sich durch den Herstellungsprozess von gehärteten, denaturierten und keimfreien Hilfsstoffen aus Eiweiß und frischem Hühnerlei. Dieser Komplex ist grob dispergiert und kolloidal gelöst.



BESONDERE VORSICHT BEI DER ANWENDUNG VON RETTERSPIZ INNERLICH

- Säuglinge und Kleinkinder: Geben Sie dieses Medizinprodukt an Kinder unter zwei Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.
- Ältere Menschen: Keine Einschränkung bei älteren Menschen.
- Schwangerschaft: Auch geringe Mengen Alkohol sind in bestimmten Stadien der Schwangerschaft zu meiden. Im Zweifelsfall fragen Sie vor der Einnahme Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Enthält 2 Vol.-% Alkohol.
- Stillzeit: Es gibt keinen Hinweis und keine Erkenntnis, dass durch die Einnahme von *Retterspitz Innerlich* während der Stillzeit eine Störung auftritt. Im Zweifelsfall fragen Sie vor der Einnahme Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Enthält 2 Vol.-% Alkohol.
- Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen: Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

WICHTIGE WARNHINWEISE

Ist bei Ihnen eine Niereninsuffizienz diagnostiziert worden, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob Sie *Retterspitz Innerlich* einnehmen dürfen.

WIE IST RETTERSPIZ INNERLICH ANZUWENDEN ?

Dosierung und Art der Anwendung:

Der in der Flasche abgelagerte Bodensatz wird vor jeder Entnahme kräftig aufgeschüttelt. Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene drei- bis fünfmal täglich 20 ml *Retterspitz Innerlich* eine Viertelstunde vor den Mahlzeiten ein. Kinder bekommen ab dem zweiten Lebensjahr drei- bis fünfmal täglich einen Esslöffel (15 ml) voll verabreicht. *Retterspitz Innerlich* wird unverdünnt eingenommen. Entnommene Flüssigkeit soll nicht in die Originalflasche zurückgegossen werden. Bei chronischer Magen-Darm-Schwäche älterer Personen ist die langfristige, über mehrere Jahre reichende Einnahme möglich.

Wenn Sie die Anwendung von *Retterspitz Innerlich* vergessen haben, nehmen Sie die normale Dosis bei der nächsten Gelegenheit. Ist es beabsichtigt oder unbeabsichtigt zu einer Überdosierung der empfohlenen Einnahmemenge von *Retterspitz Innerlich* gekommen, so besteht keine Gefahr.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH ?

Nebenwirkungen sind keine bekannt.

Sollten Nebenwirkungen auftreten, so teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

WIE IST RETTERSPIZ INNERLICH AUFZUBEWAHREN ?

Retterspitz Innerlich bitte unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen Retterspitz Innerlich nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.



HINWEIS AUF ANBRUCH

Anbruchflasche sorgfältig verschlossen nicht über +25 °C, am besten im Kühlschrank, aufbewahren. Der Anbruch sollte innerhalb von 12 Wochen aufgebraucht werden.

AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über +25 °C aufbewahren. *Retterspitz Innerlich* im Umkarton aufbewahren, um Inhalt vor Licht zu schützen.

SONSTIGE HINWEISE

Sollte sich einmal eine Flasche nur schwer öffnen lassen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Tauchen Sie die Flasche, mit dem Verschluss nach unten zeigend, für einige Minuten in ca. +50 °C warmes Wasser. Dann sollte sie problemlos zu öffnen sein.

ZEICHENERKLÄRUNG



0197



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Vor Anwendung Gebrauchs-
information lesen



Lagerbedingungen



Hersteller

HERSTELLER

Retterspitz GmbH & Co. KG

Laufer Straße 17-19

D-90571 Schwaig

Telefon +49 (0) 911 50 700-0

Fax +49 (0) 911 50 700-845

www.retterspitz.de